

FALCON® FORTE

FUNGICIDAS

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 53 g/l, spiroksaminas 224 g/l, tebukonazolas 148 g/l

Produkto forma: koncentruota emulsija

Plataus spektro, sisteminio veikimo, triazolų ir spiroketalaminų cheminių grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių ir žieminių rugių ligų.

Skirtas profesionaliam naudojimui.



KENKSMINGAS



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Kenksmingas įkvėpus ir prarijus.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti patekimo į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mėvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

**SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR
APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
REIKALAVIMUS!**

Pakuotė: 1 l, 5 l, 15 l
Registracijos Nr. 0379F/10
Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai.

Gamintojas

Bayer CropScience AG,
Alfred-Nobel Straße 50,
D-40789 Monheim, Vokietija

Registracijos savininkas

Bayer CropScience AG,
Alfred-Nobel Straße 50,
D-40789 Monheim, Vokietija
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 686 88444, faks. 8 37 237809

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

FALCON FORTE yra sisteminis fungicidas, kuris naikina lapų ir varpų ligų sukėlėjus žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose ir žieminiuose rugiuose. Fungicidas pasižymi apsauginiu poveikiu, kai naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams, ir gydymoju, kai naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.

Žieminius ir vasarinius kviečius apsaugo nuo:

Miltligės (*Blumeria graminis*)
Lapų septoriozės (*Septoria tritici*)
Varpų septoriozės (*Septoria nodorum*)
Kviečių dryžligės (*Drechslera tritici-repentis*)
Rudųjų rūdžių (*Puccinia recondita*)

Žieminius ir vasarinius kvietrugių apsaugo nuo:

Miltligės (*Blumeria graminis*)
Lapų septoriozės (*Septoria tritici*)
Varpų septoriozės (*Septoria nodorum*)
Kviečių dryžligės (*Drechslera tritici-repentis*)
Rinchosporiozės (*Rynchosporium secalis*)
Rudųjų rūdžių (*Puccinia recondita*)

Žieminis rugius apsaugo nuo

Miltligės (*Blumeria graminis*)

Rinchosporiozės (*Rynchosporium secalis*)

Rudųjų rūdžių (*Puccinia recondita*)

Purškimo laikas ir norma

FALCON FORTE purškimo norma 0,6-0,8 l/ha.

FALCON FORTE purškimo laikas:

Nuo lapų ligų kviečiai, kvietrugiai ir rugiai purškiami bambėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 30–69), o *nuo varpų ligų* (varpų septoriozės, miltligės) - plaukėjimo viduryje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 55–69).

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.

Žieminis ir vasarinius miežius apsaugo nuo:

Miltligės (*Blumeria graminis*)

Tinkliškosios dryžligės (*Drechslera teres*)

Smulkiųjų rūdžių (*Puccinia hordei*)

Rinchosporiozės (*Rynchosporium secalis*)

Dalinai apsaugo nuo Ramularijos (*Ramularia collo-cygni*)

Purškimo laikas ir norma

FALCON FORTE purškimo norma 0,6-0,8 l/ha.

FALCON FORTE purškimo laikas:

Nuo lapų ligų miežiai purškiami bambėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61), o *nuo varpų ligų* (miltligės) – plaukėjimo viduryje – žydėjimo pradžioje (BBCH 55–61).

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 51 diena.

Veikimo laikas

Veikimo laikas priklauso nuo ligos intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo kokybės. FALCON FORTE apsaugo augalus mažiausiai 3-4 savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu apsaugos programoje FALCON FORTE naudojamas tik 1 kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią FALCON FORTE normą.

Vandens kiekis: 200-400 l/ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius: 2.

Po purškimo iki lietaus turėtų praėti 1 val. (kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).

PASTABOS

- Purkšti įprastais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniiais purkštukais.
- Purkšti tik sausus augalus.
- Nenaudoti esant stipriam vėjui.
- Nuo miltligės galima purkšti esant +5-+12 °C temperatūrai, o purškiant nuo kitų ligų oro temperatūra neturi būti žemesnė nei +12°C

•Kai FALCON FORTE naudojamas pagal rekomendacijas, nepažeidžia augalų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pageltimas), kai javai purškiami esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (esant žemesnei nei +12°C arba aukštesnei nei +25°C temperatūrai, mažai santykinei oro drėgmei), kurie vėliau pranyksta ir neigiamos įtakos derliui neturi.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Neatmetama galimybė, kad naudojant fungicidą FALCON FORTE gali išsivystyti atsparios patogeninių grybų populiacijos, ko pasekoje efektyvumas gali sumažėti.

Produktą sudaro trys veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms, todėl sumažėja galimybė išsivystyti patogenų rezistencijai. Fungicidą FALCON FORTE būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje.

TIRPALO RUOŠIMAS

Prieš pradėdant tirpalo ruošimą, būtina patikrinti, ar išplautas purkštuvą, kad nebūtų kitų pesticidų likučių. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirtą vandens ir įjungti maišyklę. Produktą gerai suplakti pakuotėje. Reikiamą produkto kiekį lėtai ir tolygiai supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurškstas nedelsiant. Purškimo ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Po darbo purkštuvą išplauti, paplavas išpurkšti ant jau purkštų fungicidu plotų. Neleisti produktui patekti į vandens telkinius, nutekamuosius vandenius.

LAIKYMAS

Laikyti originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, 0°C - +30°C temperatūroje, vaikams ir pašaliniams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų. Galiojimo laikas 2 metai.

SAUGOS PRIEMONĖS

Nėštumo metu ir vaisingo amžiaus moterys turėtų vengti kontakto su šiuo produktu. **Odos ir kūno apsauga.** Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant produktą užterštus paviršius būtina dėvėti 3 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), po kuria turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais dėvėti apsauginę aprangą. Darbuotojams dirbantiems šiuo produktu apdorotų augalų plotuose, rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Akių apsauga. Būtina dėvėti akių apsaugos priemones (atitinkančias standartą EN166) bei tvirtą avalynę. Vengti patekimo į akis, o patekus nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Rankų apsauga. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4$ mm) ar kt. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti.

Kvėpavimo takų apsauga. Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą EN 14387). Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti (sudeginti).

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, anglies dioksidas (CO₂), putos, smėlis. Nenaudoti aukšto spaudimo vandens srovės. Gaisro metu stengtis neįkvėpti dūmų. Ugniagesiai privalo naudoti visiškai apsaugantį kostiumą ir kvėpavimo aparatą. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovus supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Pagrindinis reikalavimas – išvesti ar išnešti nukentėjusį iš pavojaus zonos. Nedelsiant nurengti suteptus drabužius ir saugiai pašalinti. Nukentėjusį transportuoti paguldžius ant šono.

Įkvėpus

Išnešti nukentėjusį į gryną orą. Šiltai užkloti ir leisti ramiai pailsėti. Nedelsiant kviesti gydytoją.

Patekus ant odos

Nedelsiant plauti odą dideliu kiekiu vandens su muilu. Kviesti gydytoją.

Patekus į akis

Nedelsiant praplauti akis dideliu kiekiu vandens. Plauti mažiausiai 15 min. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius po pirmųjų 5 plovimo minučių. Jei sudirgimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Kviesti gydytoją nedelsiant. Skalauti burną vandeniu. NESKATINTI VĖMIMO.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

Informacija gydytojui

Veikliosios medžiagos protiokonazolas ir tebukonazolas priklauso triazolų cheminei grupei, spiroksaminas – spiroketalaminų. Priešnuodis nežinomas, taikyti simptominį gydymą.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo

išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

®-registruotas Bayer CropScience AG, Vokietija prekės ženklas.